



Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público



nacional financiera


Cáncer de cérvix



2025
Año de
La Mujer
Indígena

¿Qué es?


- El cáncer cérvico uterino es una alteración celular que se origina en el epitelio del cuello del útero y que se manifiesta, inicialmente, a través de lesiones de bajo y alto grado, de avance lento y progresivo hacia cáncer invasor.






Panorama

- El cáncer cérvico uterino ocupa el primer lugar en incidencia causada por tumores malignos.
- En la población femenina, el cáncer cérvico uterino es la primera causa de muerte por neoplasias malignas, particularmente en el grupo de 25 a 64 años de edad.





- Según la organización mundial de la salud (OMS), en 2022 se registraron aproximadamente 660.000 nuevos casos y 350.000 muertes por cáncer de cuello uterino en todo el mundo.
- En México anualmente se estima una ocurrencia de 13,960 casos. En 2022 la mortalidad fue de 847,716.





Signos y Síntomas

- Sangrado intermenstrual
- Sangrado postcoital
- Sangrado posmenopáusico
- Apariencia anormal del cérvix (sospechosa de malignidad)
- Descarga vaginal (manchado de sangre)
- Dolor pélvico





Factores de riesgo:

- Mujeres de 25 a 64 años de edad.
- Inicio de relaciones sexuales antes de los 18 años.
- Antecedentes de enfermedades de transmisión sexual.
- Infección cérvico vaginal por virus del papiloma humano.
- Múltiples parejas sexuales (del hombre y de la mujer).
- Tabaquismo.
- Desnutrición.
- Deficiencia de antioxidantes.
- Pacientes con inmuno-deficiencias.
- **NUNCA HABERSE PRACTICADO EL ESTUDIO CITOLOGICO**





Prevención

- Existen dos **vacunas** contra el virus del papiloma humano que tienen licencia: una **vacuna tetravalente**, HPV4 (Gardasil), para la prevención de cáncer cérvico uterino(en mujeres) y las verrugas genitales (en mujeres y hombres)
- **vacuna bivalente**, HPV2 (Cervarix), para la prevención del cáncer de cuello uterino en las mujeres.





Detección

- **Citología cervical:** Estudio que se realiza mediante la observación y análisis de una muestra de células del endocérnix y exocérnix a través de un microscopio, para determinar cambios o alteraciones en la anatomía y fisiología de las células. También conocida como Prueba de Papanicolaou.
- Pruebas biomoleculares como Captura de Híbridos y RPC, pueden ser utilizadas como complemento de la citología.





¿Como acudir al estudio?

- Las pruebas de Papanicolaou son efectivas incluso si tuvo relaciones sexuales recientemente.
- Si tiene su periodo el día de la prueba, se puede hacer aunque tenga sangrado.





¿Cuándo realizar?




- La edad óptima para iniciar el tamizaje es desconocida y esto se documenta con la historia natural de la infección del virus del papiloma humano y el cáncer cervical, que por lo tanto sugiere realizar el tamizaje de una forma confiable, dentro de los tres años después de la primera relación sexual o hasta los 21 años, cualquiera que ocurra primero.





¿Cada cuando realizar?

- Las mujeres con muestra citológica inadecuada para el diagnóstico deberán ser localizadas en un lapso no mayor a 4 semanas, para repetir la prueba.
- mujeres con dos citologías anuales consecutivas **con resultado negativo** a lesión intraepitelial o cáncer, se realizará la detección cada 3 años.



26 DE MARZO

DÍA MUNDIAL DE LA
*Prevención del Cáncer
de Cuello de Útero*



GRACIAS



Gobierno de
México

